

# Hedera Helix/Benzocaína CEDRÍC® Pocket

Extracto de hojas de hiedra desecadas



CARAMELOS

Industria Argentina  
Venta Libre

## Mucolítico - Analgésico bucofaríngeo

### Composición:

Cada caramelo contiene: Extracto de hojas de hiedra desecadas (Hedera Helix) 65 mg; Benzocaína 10 mg. Excipientes: Azúcar; Glucosa líquida.

### Acción terapéutica:

Mucolítico - Analgésico Bucofaríngeo.

### Uso del medicamento:

Lea detenidamente ésta información: Está indicado para el alivio sintomático de estados gripales que cursen con tos y dolor de garganta.

### ¿Cómo usar este medicamento?

En adultos y mayores de 12 años: Puede utilizarse 1 caramelo 2 veces por día (130 mg de extracto seco de Hedera Helix).

Pueden ingerirse como máximo diariamente: 4 caramelos (40 mg de Benzocaína).

Los caramelos se dejan disolver lentamente en la boca, también pueden masticarse. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 5 días, consulte a su médico para reevaluar el cuadro respiratorio y el tratamiento.

La duración del tratamiento no debe ser mayor a 7 días.

### Advertencias y precauciones:

Antecedentes de hipersensibilidad o intolerancia conocida al extracto seco de hojas de hiedra desecadas, a la benzocaína o a cualquiera de los componentes del medicamento.

En caso de empeoramiento de los síntomas respiratorios, malestar persistente, o aparición de insuficiencia respiratoria, fiebre o también expectoración purulenta o con sangre, se debe consultar al médico de inmediato. El agente extractivo etanol al 30% (p/p) sirve para obtener el extracto efectivo para el tratamiento a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica con posterioridad elimina completamente del extracto el contenido de alcohol.

**Embarazo y lactancia:** Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

**Uso en pediatría:** No se recomienda su uso en pediatría. No administrar en pacientes con edad avanzada pues la Benzocaína produce toxicidad en ese grupo etario.

Si aparecen signos de intoxicación deberá suspenderse su administración. Debido al riesgo de efectos adversos sistémicos cuando los anestésicos locales son absorbidos rápidamente, deberá evaluarse la relación costo-beneficio cuando este medicamento debe ser aplicado sobre tejidos inflamados o infectados (mucosa dañada).

Benzocaína y sus metabolitos pueden antagonizar la actividad antibacteriana de las sulfamidas. Los inhibidores de la colinesterasa plasmática pueden inhibir la metabolización de Benzocaína.

### **Sobredosificación:**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- **Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez** Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- **Hospital A. Posadas** Tel.: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777.
- **Centro Nacional de Intoxicaciones:** 0800-3330160.

**Para otras consultas:** Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532.

### **Presentación:**

Caramelos: Envases conteniendo 9 y 144 caramelos. Esta última se presenta en dispensador de 16 blisters por 9 caramelos.

### **Conservación:**

Conservar a temperatuta ambiente entre 15 °C y 30 °C, al abrigo de la luz.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente  
Certificado N°: 54.471

Elaborado por Laboratorio ELEA S.A.C.I.F.y A.

Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.

