



Solución oftálmica estéril
Venta Libre - Industria Argentina

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR USUALIX,
SOLUCION OFTÁLMICA ESTÉRIL**

Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene USUALIX?

Cada mililitro de Usualix contiene:

Príncipio Activo: Tetrahidrozolina clorhidrato 0,50 miligramos.

Príncipios Inactivos (Excipientes): cloruro de benzalconio solución, Edetato disódico dihidrato, ácido bórico, borato de sodio decahidratado, cloruro de sodio, hidroxipropilmeticelulosa, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada.

Acción:

Descongestivo ocular.

¿Para qué se usa Usualix?

Usualix es un medicamento de uso oftálmico exclusivo, indicado para el rápido alivio temporal del enrojecimiento ocular. Calma el malestar y la irritación ocular leve ocasionados por ejemplo tras la exposición a humo, polvo, agua clorada, luz (ya sea solar, rayos ultravioleta(UV), luz de neón, televisión, como por pantallas de computación), o por corrientes de aire, cosméticos, lentes de contacto, entre otros.

¿Qué personas no pueden recibir Usualix?

NO USE este medicamento si usted:

- Es alérgico al principio activo (tetrahidrozolina) o a otro de los principios inactivos de la formulación
- Es hiper sensible/alérgico a agentes adrenérgicos o aminas simpaticomiméticas.
- Tiene glaucoma de ángulo estrecho (enfermedad ocular con aumento de la

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 57.266
Laboratorio ELEA S.A.C.I.F. y A - Sanabria 2353, CABA.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Enero / 2014
502029-10 1-sm-gm

ELEA



presión intraocular, que puede dañar el nervio óptico).

- Tiene Conjuntivitis microbiana o infecciosa.
- Está en tratamiento con IMAO (antidepresivos como trancipromina).
- Está embarazada o amamantando.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?

No utilizar si el frasco no tiene el precinto de seguridad de la tapa intacto, previo a su uso.

Tenga en cuenta que Usualix es una solución oftálmica estéril de uso externo exclusivo, es decir es sólo para uso externo, y solo de aplicación tópica en el ojo.

Consulte a su médico si ud. tiene:

- Glaucoma.
- Infección microbiana oftálmica.
- Hipertensión arterial.
- Enfermedades del corazón.
- Diabetes.
- Hipertiroidismo.
- Si usa lentes de contacto tenga la precaución de quitárselos antes de aplicar Usualix y colocárselos por lo menos 15 minutos después.
- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.
- Para la aplicación a niños menores de 6 años, consulte con su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando Usualix?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como aumento del tamaño pupilar (midriasis) temporal, picazón o ardor ocular (ante el uso excesivo), incremento de la presión ocular. Ocasionalmente se han descripto cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. Suspender el tratamiento en esos casos y consultar con su médico.

Si ud. se aplica otros descongestivos o gotas oftálmicas puede aumentar el enrojecimiento ocular.

Si usted toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Antidepresivos del grupo de los IMAO como trancipromina.
 - Antihipertensivos (medicación para la presión arterial)
 - Hipoglucemiantes orales (medicamentos para el tratamiento de la diabetes)
- debe consultar a su médico ya que podrían interferir con el uso de Usualix.

Si el desconfort o enrojecimiento persisten por más de 72 horas o empeoran consulte a su médico.

Suspenda el uso de Usualix y consulte a su médico si se presentara dolor a nivel ocular, cambios súbitos en la visión en la visión, aparición de manchas tipo "moscas" en el campo visual incremento de la irritación ocular, o si la afección persiste luego de 3 días de tratamiento.

¿Cómo se usa este medicamento?

Usualix es de administración tópica oftálmica.

Como posología habitual se sugiere: 1 a 2 gotas en el/los ojo/s afectados, hasta 4 veces al día.

El efecto descongestivo es inmediato tras la administración y se mantiene de 4 a 6 horas.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1- Lávese bien las manos antes de aplicar Usualix

2- Abra la tapa del envase. Ante el primer uso rompa el precinto de seguridad.

3- Aplique el producto en el saco conjuntival del/los ojo/s afectado/s evitando que contacte la punta del gotero con el ojo, piel u otras superficies, en caso de utilizar lentes de contacto debe quitárselos antes de la aplicación de Usualix y luego de 15 minutos volver a colocarlos:

Sugerencia para la autoadministración de gotas:

- Incline la cabeza levemente hacia atrás y mire hacia un punto fijo en el techo.
- Con el dedo índice, presione el párpado inferior hacia abajo con suavidad formando una bolsa, este espacio es el saco conjuntival,
- Presione el frasco gotero para permitir que la gota caiga en la bolsa o saco conjuntival,
- Luego de aplicar la gota, cierre sus ojos suavemente sin apretarlos
- Oprima levemente la parte interior del ojo (por donde salen las lágrimas) Mantenga sus ojos cerrados, antes de abrirlos límpie suavemente con un pañuelo desechable limpio de papel lágrimas o restos de medicamento no absorbidos
- 4- Finalizada la aplicación coloque nuevamente la tapa en el envase.
- 5- Lávese nuevamente las manos, para evitar transportar posibles restos del medicamento.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Ante una sobredosis o ingesta accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777
- Hospital de Niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330-160.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532

Anmat responde: 0800-333-1234

Presentaciones:

Frascos goteros contienen 12ml de Solución Oftálmica Estéril.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

¿Cómo guardar este producto? Modo de conservación:

Conservar a temperatura ambiente hasta 30° C.

Una vez abierto el envase por primera vez, se recomienda utilizarlo para un tratamiento individual y desecharlo una vez concluido el mismo

Verifique la fecha de vencimiento antes de aplicar este o cualquier medicamento.