

Dosdías-N®

Levonorgestrel - Etinilestradiol

Comprimidos



Industria Uruguaya
Venta bajo receta

Fórmula:

Cada comprimido contiene: Levonorgestrel 2,00 mg; Etinilestradiol 0,20 mg. Exc.: lactosa; almidón de maíz; celulosa microcristalina PH 101; ácido estérílico.

Acción Terapéutica:

Hormonoterapia de las amenorreas.

Indicaciones:

Diagnóstico de las amenorreas secundarias.

Acción Farmacológica:

El estrógeno contenido en la fórmula Etnilestradiol, estimula la proliferación de las glándulas endometriales. El levonorgestrel o la progesterona desarrollan un endometrio secretorio. Por lo tanto, si el endometrio tiene capacidad de responder al estímulo estropogestacional se producirá un sangrado por deprivación.

Posología y Modo de administración:

Administrar un comprimido durante dos días consecutivos. Entre tres y siete días después de la toma del primer comprimido aparecerá una hemorragia vaginal si el endometrio es respondiente.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Tromboflebitis o trastornos tromboembólicos. Afecciones cerebro-vasculares o cardiopatías. Neoplasia mamaria conocida o sospechada. Neoplasia estrógeno-dependiente. Hemorragia genital anormal no diagnosticada. Embarazo. Tumores hepáticos benignos o malignos. Trastornos graves de la función hepática. Historia de ictericia idiopática o prurito durante el embarazo. Síndrome de Dubin-Johnson. Síndrome de Rotor. Trastorno del metabolismo de los lípidos. Antecedentes de herpes durante el embarazo. Diabetes grave. Otosclerosis con empeoramiento durante el embarazo.

Precuciones y Advertencias:

El corto tiempo de administración limita la posibilidad de aparición de efectos adversos. No obstante, es aconsejable antes de iniciar el tratamiento una consulta médica para una correcta historia clínica. Antes de la administración de hormonas el control ginecológico es importante para un correcto diagnóstico diferencial de la amenorrea y una evaluación ginecológica completa. Los pacientes con antecedentes tromboembólicos deben evitar la administración de asociaciones estropogestágenas (ver **Contraindicaciones**) salvo que el profesional entienda que los beneficios superan el riesgo.

Reacciones Adversas:

Ocasionalmente se puede presentar intolerancia gastrointestinal, cefalea, edema, rash cutáneo y tensión mamaria. Muy raramente puede presentarse hipertensión arterial, accidentes cardiovasculares y trombóticos, ictericia, migraña, vértigo.

Sobredosisificación:

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosisificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160

Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532.

Presentaciones:

Dosdías N® comprimidos: envase conteniendo 2 comprimidos.

Condiciones de Conservación y Almacenamiento:

Conservar por debajo de los 40 °C, preferentemente entre 15°C y 30°C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Esp. Med. aut. por el M.S.

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.

Sanabria 2353, CABA.

Dir. Téc.: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

Certificado Nº 37.677

Elaborado en Urufarma S.A., República Oriental del Uruguay.

Última revisión: Septiembre/1998

502696-01 LI-6102-07 1-pm-w

ELEA