

Lisovyr® Aciclovir

Crema

Industria Argentina
Venta bajo receta

Fórmula:

Cada 100 gramos de crema contiene: Aciclovir 5,00 g.
Excipientes: alcohol cetílico; alcohol estearílico; aceite mineral; polisorbato 60; sorbitan monoestearato; propilparabeno; metilparabeno; propilenglicol; agua purificada.

Acción terapéutica:

Antiviral.

Indicaciones:

1. Tratamiento del herpes genital inicial o recurrente producida por Herpes simplex en pacientes inmunocomprometidos; no obstante el aciclovir sistémico es más efectivo.
2. Tratamiento adjuvante de las infecciones por Herpes zoster en pacientes inmunocomprometidos que hayan comenzado tratamiento por vía sistémica con otros regímenes de tratamiento para herpes zoster.

Desarrollo de resistencia al aciclovir ha sido reportada con el tratamiento prolongado en pacientes inmunocomprometidos.

Posología y forma de administración:

Adultos y niños:

Aplicar sobre la piel o las mucosas cada tres horas, seis veces al día durante siete días. La cantidad a aplicar deberá ser suficiente para cubrir adecuadamente todas las lesiones.

La terapia debe ser iniciada tan pronto como sea posible seguida a la aparición de los signos y síntomas de la infección por virus del grupo herpes.

Precauciones y advertencias:

Este medicamento es para uso cutáneo exclusivo y no puede ser aplicado en los ojos.

- El uso de antivirales por vía tópica puede conducir a sensibilización cutánea, resultando en reacciones de hipersensibilidad con el

subsecuente uso tópico o sistémico de esta medicación.

- ~ No todos los pacientes con infecciones con virus del grupo herpes requieren tratamiento con aciclovir tópico.
- ~ Embarazo: Debido a que no han sido realizados estudios bien controlados, aciclovir no debe ser usado durante el embarazo, a menos que los beneficios para la madre superen los riesgos potenciales para el feto.
- ~ Lactancia: No es sabido aún, si el aciclovir usado en forma tópica es excretado en la leche materna, por lo que se recomienda tener precaución cuando este medicamento sea indicado en mujeres amamantando.

Contraindicaciones:

La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente evaluada en las siguientes condiciones:

- ~ Hipersensibilidad al aciclovir tópico.
- ~ Embarazo.
- ~ Lactancia.

Efectos adversos:

- ~ *Incidencia más frecuente (28% aproximadamente):* dolor moderado, edema, ardor y/o pinchazos en el sitio de aplicación.
- ~ *Incidencia menos frecuente (4% aproximadamente):* prurito.
- ~ *Incidencia rara (0,3% aproximadamente):* rash cutáneo.

Información para el paciente:

- ~ No aplique este medicamento en los ojos.
- ~ Comunique a su médico si se encuentra embarazada o está amamantando.
- ~ Comunique a su médico si está tomando otra medicación, sea ésta recetada por un profesional o de venta libre.



- Verifique la fecha de vencimiento antes de ingerir o de aplicar un medicamento.
- Recuerde que un medicamento beneficioso para usted puede ser perjudicial para otra persona.
- No olvide comunicar a su médico si padece alguna enfermedad concomitante o si ha presentado en alguna oportunidad alergia a este u otro medicamento.
- No suspenda bruscamente ninguna medicación a menos que sea indicado por su médico.
- En caso de intoxicación consulte inmediatamente a su médico o a un centro asistencial.
- Ante la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas consulte a su médico: dolor, picazón, ardor y/o enrojecimiento en la zona donde se aplica este medicamento.
- Aplique este medicamento en la cantidad y con la periodicidad indicada con su médico.
- Guarde los medicamentos dentro de su envase original conservando los prospectos.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Htal. de Pediatría R. Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Htal. A. Posados: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea **0800-333-3532**.

Presentación:

Pomo con 5 gramos de crema.

Conservar entre 15 °C y 30 °C en envase bien cerrado.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 29.605.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.
Elaborado en Sanabria 2353, CABA.
Última revisión: Mayo / 1997.
502638-00 1-gd-g

