

Conservación: Conservar entre 15 °C y 30 °C.
 Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
 Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
 Cert. N° 48946 - Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A.,
 Avda Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Bs. As. bajo
 licencia exclusiva de Warner Lambert Co., U.S.A. - Director
 Técnico: Alfredo J. Boccardo, Farmacéutico.



PARKE-DAVIS
 Bajo Lic. W.L.



Sabor
 Frutilla
 Silvestre

Sin Azúcar



Carbonato de Calcio e Hidróxido de Magnesio

Antiácido

**24 COMPRIMIDOS
 MASTICABLES**

Venta Libre
 INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO:

MYLANTA®

Carbonato de Calcio
 e Hidróxido de Magnesio

MYLANTA®

¿Dudas? ¿Consultas?
 0800-22-ACIDEZ (2244339)
 Anmat responde: 0800-333-1234

NO UTILIZAR si el cierre de seguridad
 del envase no está íntegro, antes de
 ser abierto.

MYLANTA®



Fórmula: Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 90% 444 mg (equivalente a 400 mg de Carbonato de Calcio), Hidróxido de Magnesio 95% 142 mg (equivalente a 135 mg de Hidróxido de Magnesio).
 Excipientes: sorbitol, manitol, sucralosa, sabor frutilla, polivinilpirrolidona, colorante D y C Rojo N° 2 laca, crospovidona, estearato de magnesio. **Este medicamento es Libre de Gluten.**

Acción Terapéutica: Mylanta® es un antiácido de agradable sabor que brinda alivio a los síntomas de irritación de la mucosa estomacal. El Carbonato de Calcio y el Hidróxido de Magnesio se combina con el ácido del estómago produciendo su neutralización. **Indicaciones:** alivio del ardor epigástrico, indigestión ácida, acidez gástrica, trastorno gástrico asociado con dichos síntomas. **Dosis y administración:** Disolver en la boca de 2 a 4 comprimidos cuando sienta acidez o ardor gástrico. Repetir cada hora si reaparecen los síntomas hasta un máximo de 18 comprimidos por día. Mylanta® se toma sin agua. Simplemente se introducen los comprimidos en la boca y se disuelven lentamente, o se mastican. No contienen sodio, ni azúcar.

Advertencias y Precauciones: •No tomar más de 18 comprimidos en las 24 horas o la dosis máxima por más de dos semanas. •Si los síntomas no mejoran o empeoran en dos semanas consulte a su médico. •Si usted tiene una enfermedad renal, no tome este producto excepto bajo la indicación y supervisión del médico. •Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos. Si usted está tomando un medicamento, no tome este producto sin consultar al médico. •Si usted está embarazada o amamantando consulte a su médico y/o farmacéutico antes de ingerir este medicamento.

Sobredosificación: Ante la eventualidad de una intoxicación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital A. Posadas: tel. (011) 4654-6648/4658-7777. Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-3330160.

Presentaciones: Mylanta® se presenta en los siguientes sabores: Frutilla Silvestre, Limón Refrescante y Menta Fresca, en envases conteniendo 24 comprimidos y Dispenser de 96 comprimidos.

MYLANTA®

